

REGISTRERING AV FUGLELIVET VED NITELVA VAREN 1987.

N O R D R E A Y E R E N F U G L E S T A S J O N

O S L O

November 1987

Registreringsperioden foregikk fra siste del av april til begynnelsen av juni, med i alt 11 besøk. Det sier seg selv at en slik overfladisk undersøkelse ikke vil gi noe heldekkende bilde av lokalitetens fugleliv. Imidlertid gir den et visst innblikk i hvilke arter som dominerer i forskjellige soner langs gangveien.

Innledningsvis ble det klart at deler av strandsonen langs Nitelva var alt for opparbeidet til å gi grunnlag for et variert fugleliv. Det gjelder spesielt vest for Nitelva ned til flomvollen. Sydover langs vollen er det ikke fri sikt til strandsonen når man beveger seg langs gangstien. Videre er strandsonen i tilknytning til Nebbur svollen Bad preget av lignende forhold. Vi har derfor valgt å koncentrere oss om visse soner som fremdeles gir grunnlag for et moenlunde rikt fugleliv. Disse sonene er hver for seg relativt homogene biotopsmessig og befinner seg i eller øst for Nitelva (se kart).

Opplysningene blir presentert sonewis fra gangveiens begynnelse ved Strømsbrua og nord til gangbrua over Nitelva.

SONE A - Nitelva.

Midten av april:

Lite åpent vann. Svært lav vannstand. Isfrie områder begrenset til osen i Sagdalselva og råk 3-400 meter fra Strømsbrua og nordover. Et fåtal stokkender (6) og en kvinandhunn. Dessuten 2-300 hettemåker og 3 fiskemåker.

Slutten av april:

Nitelva helt åpen. Økende aktivitet. En del vannfugl som før en stor del må regnes som trekkgjester. 2 kanadagjess, 7 kvinender, 2 laksender, 5 krikkender, 2 brunmakker og 3 hanner av toppand og 1 hunn toppand. Dessuten 1 sothøne som antagelig var nyankommet for å hekke (Sone B).

Første halvdel av mai:

Høy vannstand. Svært lite fugl. Kun et par knoppsvaner, 4 kanadagjess og en hann stokkand observert foruten 80-100 gråmåker.

Siste halvdel av mai/begynnelsen av juni:

Minimalt fugleliv. Kun spredte individer av stokkand og knoppsvane.

Kommentar:

Det var hele tiden et varierende antall hettemåker til stede, som utvilsomt stammet fra kolonien i sone B.

SONE B - Dammer langs østsiden av gangveien.

Midten av april:

Koloni med hettemåker under etablering. Forøvrig lite å se.

Slutten av april:

Hettemåkekolonien anslatt til 4-500 par. Forøvrig en mengde andre arter godt i gang. Minst 2 par sothøne så ut til å hekke. Likeledes flere kanadagjess og minst 1 par med stokkender. Forøvrig observert 1 knoppsvane, 1 skogsnipe og 1 par vipe.

Første halvdel av mai:

Sterkt økende aktivitet, med større innslag av trekkende arter, spesielt vadefugl. 9 brushøns i fullt spill, 4 rødstilk, 10 grønnstilk og 1 strandsnipe. Dessuten krikkand, toppand, knoppsvaner, kanadagjess og stokkender. Hele sju sothøner registrert ved et tidspunkt og 3 reir iakttatt. I tillegg ble observert 2 sivhøner som trolig hekket. 2 toppandhanner alene kunne tyde på hekking. Minst 3 reir av kanadegås konstatert. Forøvrig både kjøttmeis, linerlø, kjøttmeis, skjære og gråtrost observert i tillegg til 4 viper. Vipene var trolig hekkefugl.

Siste halvdel av mai:

Både grønnstilk, rødstilk og brushane til stede. Rødstilk varslet og kunne tyde på hekking. Forøvrig det sedvanlige innslag. Liten gråtrostkoloni konstatert.

### Begynnelsen av juni:

Hettemåkekolonien var tydeligvis blitt utsatt for parbelstreker. Kun 70-80 individer igjen i området. En del småfugl hevdet territorium: 1 syngende rørsanger, 1 syng. sivspurv, 1 syng. buskskvett.

### Kommentar:

Sone B pekte seg ut som det klart beste fugleområdet. Våtmarkspreget tiltrekker en svært variert fuglefauna og når så hettemåkene fant å etablere seg i området, gjør dette lokaliteten bare enda mer attraktiv for andre arter. Dessverre ble kolonien ødelagt.  
I det høye sivet sang rørsanger - en art som for en stor del er knyttet til takrør og dunkjevle, dvs. vegetasjon som ikke er altfor utbredt i Norge.

### SONE C - Skogparti barskog/løvskog - småfugllokalitet.

#### Siste halvdel av april:

Grønnfink, bokfink, skjære, blåmeis og kråker observert.

#### Første halvdel av mai:

Bra småfuglliv: 5-6 rødstrupper, 8-10 linerler, 50-60 gråtrost, 8-10 rødvingetrost, 30-40 løvsangere, 2-3 blåmeis, 5-6 kjøttmeis, 2 grønnfink, 4 løvesvaler, 30-40 bokfink, 3-4 gulspurv foruten en del sivspurv. Dessuten 5-6 skjærer, 20-30 kråker, 2-3 kaier og 3-4 ringduer. Et

flertall av artene syngende.

#### Siste halvdel av mai:

Alle de tre norske svaleartene observert - sandsvale, taksvale, låvesvale. Dessuten tårnseiler som først ankommer sydfra på dette tidspunkt. Forøvrig økende innslag av de vanligste sangere, slik som hagesanger og løvsanger.

#### Begynnelsen av juni:

En hel del utflynne unger av gråtrost. Dessuten observert en svartrostthann. Ca 100 kaier og 30-40 kråker og det sedvanlige innslag av hagesangere, løvsangere, sivspurv, skjære, gulspurv, rødstrupe, linerle og kjøttmeis. 8-10 rødvingetrost.

#### Kommentar:

Skogens blandingsstruktur gir grunnlag for et relativt rikt småfuglliv. Imidlertid er deler av skogen lenger inn i ferd med å forsvinne p.g.a. hogst.

#### SONE D - Eng

Lokaliteten gunstig for visse marktilknyttede arter. Godt besøkt av trekkende heipiplærer og gulerler i første halvdel av mai. Dessuten gir et visst innslag av busker grunnlag for hekking av både sivspurv, buskskvett og tornsanger som da også ble registrert syngende der i begynnelsen av juni.

i enkeltbekkasin ble observert i et myraktig parti sydover mot sone C i begynnelsen av mai.

Karakterarter (gjelder perioden medio april-primo juni).

Sone A

- Knoppsvane - Iakttas ofte parvis fra isløsningen.
- Kanadagås - Vanlig fra isløsningen. Ofte i flokker.
- Brunnakke - Fåtallig trekkgjest. April.
- Krikkand - Spredte individer fra isløsningen. April.
- Stokkand - Vanlig fra isløsningen. Hekker trolig ved elvbredden flere steder.
- Toppand - Iakttas fåtallig fra isløsningen.
- Kvinand - Spredte individer fra isløsningen. April.
- Laksand - Spredte individer fra isløsningen. April.
- Sothøne - Tilfeldig.
- Hettemåke - Meget vanlig fra isløsningen.
- Fiskemåke - Iakttas i små antall fra isløsningen.
- Gråmåke - Meget vanlig i april fra isløsningen.  
Vanlig resten av perioden.
- Makrellterne - Regular i lite antall fra siste halvdel av mai.

Sone B.

- Knoppsvane - Hekker trolig.
- Kanadagås - Hekker. Minst 3 par.
- Stokkand - Hekker.
- Toppand - Hekker trolig.
- Sivhøne - Hekker. Minst 1 par.
- Sothøne - Hekker. Minst 3 par.
- Vipe - Hekker. 2-3 par.
- Brushane - Trekk gjest i mai. Spil kan iakttas.
- Rødstilk - Trekk gjest i mai, men hekker muligens også.
- Skogsnipe - Trekk gjest i siste halvdel av april.
- Grønnstilk - Trekk gjest i mai.
- Strandsnipe - Trekk gjest og hekkefugl.
- Hettemåke - Hekker (koloni). 4-500 par før plyndring.
- Tårnseiler - Vanlig fra siste halvdel av mai.
- Linerle - Hekker.
- Taksvale - Vanlig fra mai.
- Låvesvale - Vanlig fra mai.
- Gråtrost - Vanlig i hele perioden (liten koloni).
- Rørsanger - Lett hørbar i mai, skjønt bare i individ.

## Sone C.

Ringdue	- Hekker trolig. Karakteristisk sang. Hele perioden.
Linerle	- Hekker. Hele perioden.
Rødstrupe	- Hekker. Karakteristisk sang. Hele perioden
Svarttrost	- Hekker. Karakteristisk sang. Hele perioden.
Gråtrost	- Hekker (koloni). Hele perioden.
Rødvingetrost	- Hekker. Karakteristisk sang. Hele perioden.
Hagesanger	- Hekker. Meget vanlig fra midten av mai. Livlig sang.
Munk	- Hekker trolig. Spredte individer. Fra mai. Sangen ligner hagesangerens.
Løvsanger	- Hekker. Meget vanlig fra mai. Karakteristisk sang.
Blåmeis	- Hekker. Vanlig. Hele perioden.
Kjøttmeis	- Hekker vanlig. Karakteristisk sang. Hele perioden.
Skjære	- Hekker. Vanlig. Hele perioden.
Kaie	- Vanlig. Ofte flokkvis opptreden sammen med kråke. Hele perioden.
Kråke	- Hekker. Vanlig. Hele perioden.
Bokfink	- Hekker. Vanlig. Karakteristisk sang. Hele perioden.
Grønnfink	- Hekker trolig. Hele perioden.
Gulspurv	- Hekker. Karakteristisk sang. Hele perioden.

## Sone D

Sanglerke	- Hekker. Karakteristisk sang. Hele perioden.
Heipiplerke	- Trekkjhest. Vanlig. Ultimo april til midten av mai.
Gulerle	- Hekker trolig. De fleste er trekkjester første halvdel av mai.
Buskskvett	- Hekker. Karakteristisk sang. Fra mai.
Tornsanger	- Hekker. Karakteristisk sang. Fra siste halvdel av mai.
Gulspurv	- Hekker. Karakteristisk sang. Hele perioden.
Sivspurv	- Hekker. Karakteristisk sang. Hele perioden.

